



## EDA TÁJÉKOZTATÓ

Kedves várandós Anyuka!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy intézményünkben lehetőség van szülés során ún. epiduralis (gerincvelőközei) fájdalomcsillapítás igénybe vételére.

Az eljárás lényege: a bőr fertőtlenítése és érzéstelenítése után az ágyéki csigolyák között beszúrt tűn keresztül vékony csövet (kanült) vezetünk a szalagok és a kemény agyhártya közötti térbe. (rajz?) Ezen a kanülon érzéstelenítő, illetve fájdalomcsillapító gyógyszereket adagolunk. Ezzel az eljárással a szüléssel együtt járó fájdalom lényegesen csökkenthető, de a szülési folyamat fenntartása miatt teljes fájdalommentességet (érezéstelenítést) nem biztosít. A beavatkozás a legnagyobb biztonsággal a szülési folyamat elején végezhető el. Megelőzően aneszteziológus orvosi vizsgálatra, szükség esetén laborvizsgálatokra, illetve intravénás folyadékpótlásra (infúzió) van szükség. Bizonyos szülészeti állapotok, véralvadási zavarok, gyógyszerek szedése, gyógyszerérzékenység esetén nem végezhető el.

A beavatkozás enyhe fájdalommal járhat, a bevezetett kanül már kellemetlenséget nem okoz, az ágyban történő mozgást nem korlátozza. Az érzéstelenítőszer által kiváltott izomgyengeség miatt a járás nem biztonságos, így az ágyból felkelni nem lehet.

Mint minden orvosi beavatkozásnak, az epiduralis fájdalomcsillapításnak is lehetnek mellékhatásai, szövődményei. Leggyakoribb a vérnyomás átmeneti csökkenése, ami szédülést, hányingert okozhat, gyógyszeresen kezelhető. Átmeneti hátfájás az esetek egyharmadában lehetséges. A kemény agyhártya sérülése az esetek 1-2%-ban fordulhat elő, viszont ebben az esetben nagy gyakorisággal okoz erős fejfájást. Az érzéstelenítő szer beadásakor elhárítható szövődmény (magasra terjedő érzéstelenítés, érzéstelenítőszer toxicitás) ritkán (1:1000-5000 arányban) fordulhat elő. Még ritkábbak a súlyos, késői szövődmények (idegkárosodás, központi idegrendszeri fertőzés, gerincscatornán belüli vérzés; 1:10000-100000).

### NYILATKOZAT

Alulírott .....

kijelentem, hogy a fenti tájékoztatót elolvastam, megértettem.

Dr..... aneszteziológus szóban is tájékoztatott, részletesen felvilágosított a beavatkozás veszélyeiről. Kérdéseimre megnyugtató válaszokat kaptam.

Ezek alapján KÉREM, hogy rajtam a megbeszélte epiduralis kanülbevezetéssel járó fájdalomcsillapító eljárást elvégezzék.

.....  
aneszteziológus orvos

.....  
szülőné aláírása

Dátum:.....