



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Béni Béla főorvos

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A méhnyak kúpkimetszése (conisatio), méhszájplasztika

A beavatkozás célja, előnyei:

Méhszájrepedés vagy rosszindulatú folyamat gyanúja esetén az eltávolított méhnyak-rész pontos szövettani diagnózisa. A nőgyógyászati szűrővizsgálat során észlelt kóros rákszűrés (citológiai) és/vagy méhszáj tükrözés (kolposzkópia) leletek esetén egyértelműen tisztázza, hogy az elváltozás jó- vagy rosszindulatú. Ennek megfelelően kóros méhszáj tükrözéses (kolposzkópos) lelet, kóros rákszűrés (citológiai) lelet, vagy mindkettő előfordulása esetén végezzük. A beavatkozás nemcsak diagnosztikus, hanem terápiás megoldást is jelenthet, fiatal nőknél a kezelés ezzel a műtéttel befejeződhet. Előrehaladott folyamatok esetén további beavatkozásra és műtetre van szükség. A műtétet akár terhesség alatt is elvégezhetjük. Terhesség mellett olykor ajánlatos a beavatkozással együtt méhszájzáró műtétet is elvégezni, ennek szükségessége minden esetben egyéni elbírálást igényel.

Hogyan történik a műtét?

A műtétet érzéstelenítésben végezzük. A beavatkozás hüvelyi úton történik a méhnyakon. Kúp formájú szövetet távolítunk el a méhnyakról, amelyet szövettani feldolgozásra küldünk. A műtétet végezhetjük szikével vagy hőhatáson alapuló műtéti kezeléssel. Szükség esetén vérzéscsillapító öltéseket, esetlegesen a nyakcsatornába gumi-draint helyezünk be. A műtét kapcsán méhkaparást is végzünk. Terhesség esetén méhnyak kaparás nem történik.

A műtét lehetséges szövődményei:

Vérzés, fertőzés, a méh átfúródása, a sebgyógyulás zavara, vérrögösödés (trombózis, embólia) fordulhatnak elő. A szövődmények előfordulása ritka. Közülük sérülésszerű jellegű a műtét során a méhfal átszakadása, súlyosabb esetben a méhfal átszakadása után a hasúri szervek, főleg belek sérülése. Ezen szövődmények sebészeti ellátása is szükséges lehet, sokszor megfigyelés elégséges. Hastükrözéssel ellenőrizhető a sérülés mértéke. A műtét során előfordulhat olyan komplikáció, amely miatt a méhet hasi műtéttel kénytelenek vagyunk eltávolítani a beteg egészségének, életének megmentése céljából.

A műtét követően előfordulhat erősebb vérzés, mely esetleg vértranszfúziót tehet szükségessé. Ugyancsak a műtétet követően keletkezhet gyulladás, esetleg vérmérgezés, amelyek antibiotikum adást teszik szükségessé. A műtét után 1-2 hétig bővebb hüvelyi folyás állhat fenn. Utóvérzés ezen műtéti típus után többször fordul elő, mint más műtétek után.

Alternatív kezelési módok

A műtétes beavatkozásnak nincs alternatívája, mert a szövettani vizsgálatot – amennyiben szükség van rá – nem helyettesíti más eljárás.

A műtét elmaradásából adódó hátrányok

Nem tisztázódik a folyamat, és ha daganatos elváltozás fennáll, akkor súlyosbodó vagy gyógyíthatatlan állapot alakulhat ki.