



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Bényi Béla főorvos

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Méhkaparás (abrasio) és polypeltávolítás

A műtét célja

A méhszáj, a nyakcsatorna, a méh üregének műszeres vizsgálata, az esetlegesen kóros szövet eltávolítása, a panaszokat okozó rendellenesség felderítése, megszüntetése és a nyert anyagokból szövettani diagnózis felállítása az esetlegesen szükségessé váló további kezelések megtervezéséhez. A beavatkozás segít eldönteni, hogy a folyamat jó- vagy rosszindulatú, ezáltal segítséget nyújt a további kezeléshez. A méhűr kiürítése egyben - vérzés esetén - a vérzés megszüntetésével is jár, a fertőzés veszélye is csökken, polypus esetén annak eltávolítása hasonló célokat szolgál.

A beavatkozás menete

A műtétet intravénás érzéstelenítésben végezzük. A műtét előtt nőgyógyászati vizsgálat történik, melynek során meggyőződünk a méh nagyságáról és helyzetéről. A hüvely feltárása mellett a méhszájat látótérbe hozzuk, a hüvelyt, a boltozatot fertőtlenítyük. Ezt követően szondavizsgálattal ellenőrizzük a méh nagyságát, helyzetét, a nyakcsatornát kitágítjuk. A méh üregét küret kanállal kiürítjük. Általában külön kikaparjuk a nyakcsatornát és külön a méhüreget, külön távolítjuk el a polypusokat. Kaparás közben ellenőrizzük a méhűr alakját, egyenetlenségét, bedomborodottságot (fejlődési rendellenesség, méhizom daganat - myoma stb.). Külön óvatosságra van szükség akkor, ha felmerül a méhnyálkahártya rosszindulatú daganatának lehetősége. Az eltávolított anyagot szövettani feldolgozásra küldjük.

A beavatkozás kockázata

A méhszáj sérülése, berepedése, a méh falának átfúródása, gyulladás, vérrögösödés (trombózis, embólia) ritkán előforduló szövődmények. Közülük sérüléssel jellegű a műtét során a méhfal átszakadása, súlyosabb esetben a méhfal átszakadása után a hasúri szervek, főleg belek sérülése. Ezen szövődmények sebészeti ellátása is szükséges lehet, sokszor megfigyelés elégséges. Hastükrözéssel ellenőrizhető a sérülés mértéke. A műtét során előfordulhat olyan komplikáció, amely miatt a méhet hasi műtéttel kénytelenek vagyunk eltávolítani a beteg egészségének, életének megmentése céljából.

A műtét követően előfordulhat erősebb vérzés, mely esetleg vér transfúziót tehet szükségessé. Ugyancsak a műtétet követően keletkezhet gyulladás, esetleg vérmérgezés, amelyek antibiotikum adást teszik szükségessé.

Alternatív kezelési módok: szükség esetén későbbi időpontban méhtükrözés végezhető

A kezelés elmaradásakor várható: állapotrosszabbodás, gyógyulási esélyeinek romlása, gyógyulásának elhúzódása, esetleg életveszélyes szövődmények kialakulása.

A beavatkozás elmaradásának következménye

Nem történik meg a méh kóros elváltozásának eltávolítása, és nem kerül sor azok szövettani tisztázására.