



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Bényi Béla főorvos

BETEGTÁJÉKOZTÓ

Excisio

(szövetteni mintavétel a szeméremtesten, a hüvelyben illetve a méhszájon észlelt elváltozásból)

A beavatkozás célja

A beavatkozás célja a szeméremtesten, a méhszájon, a gáttájékon illetve a hüvelyben észlelt elváltozás kimetszése, illetve az abból történő szövetteni mintavétel. Az eltávolított anyag szövetteni vizsgálatra kerül, mely pontos diagnózis felállítását teszi lehetővé.

A beavatkozás menete

A beavatkozás intravénás altatásban történik. A szeméremtest, illetve a hüvely fertőtlenítését követően babérlevél alakú metszésből a látott képletet a szem ellenőrzése mellett, lehetőleg az épben eltávolítjuk. Vértáncsillapítást követően a sebszéleket egyesítjük. A műtétet követően, amennyiben nem felszívódó varratokkal történt a sebzés egyesítése, úgy varratszedés történik. Amennyiben a mintavétel a méhszáj területéről történik, úgy a kimetszést követően öltésekkel, szükség esetén hőhatáson alapuló eszközzel lehet végezni.

A beavatkozás lehetséges szövődményei

Mint minden műtéteti beavatkozásnak, az excisionak is lehetnek általános, az altatásból eredő és a műtétre jellemző szövődményei. Esetlegesen fertőzés, utóvérzés, vérrögképződés ezen beavatkozás után is felléphet. A szövődmények gyakorisága azonban igen csekély.

A beavatkozás elmaradásának esetleges következményei.

A beavatkozás során nyert szövetminta részletes patológiai feldolgozása során pontos kórisme felállítása lehetséges. Amennyiben a műtét nem történik meg, úgy a pontos szövetteni diagnózis hiányában a hatékony kezelés esélye jelentősen csökken, az észlelt képlet tovaterjedhet, esetlegesen rosszindulatú elváltozás alakulhat ki a talaján.