



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Bényi Béla főorvos

BETEGTÁJÉKOZTATÓ HASÜREGI FOLYADÉKBÓL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL (DOUGLAS PUNCTIO)

A beavatkozás célja, előnyei:

Bizonyos esetekben (méhen kívüli terhesség, kiterjedt kismedencei gyulladás, endometriózis, rosszindulatú nőgyógyászati folyamatok) szükség lehet, az ultrahangvizsgálattal igazolt, kismedencei folyadékgyülemről történő, mintavételre, melynek cytológiai vizsgálata pontosabb diagnózist ad a szóban forgó folyamatról. Amennyiben a folyamat előrehaladott, további beavatkozásra és műtetre van szükség.

Hogyan történik a műtét?

A beavatkozás hüvelyi úton történik. A hátsó hüvelyboltozaton keresztül egy vékony tűt használva, viszonylag minimális szöveti károsodás útján, a hasüreg legmélyebb pontjába, az úgynevezett "Douglas üregbe" jutunk, ahonnan bizonyos mennyiségű folyadékot szívunk le, amelyből cytológiai vagy laborvizsgálatokat végezhetünk.

A műtét lehetséges szövődményei:

Vérzés, fertőzés, a méh, a belek sérülése, átfúródása, a sebgyógyulás zavara fordulhat elő. A szövődmények előfordulása ritka. A műtét után 1-2 hétig bővebb hüvelyi folyás állhat fenn. Utóvérzés ezen műtéti típus után ritkán fordul elő, mint más műtétek után.

Alternatív kezelési módok

A műtétes beavatkozásnak nincs alternatívája, mert a cytológiai vizsgálatot - amennyiben szükség van rá - nem helyettesíti más eljárás.

A műtét elmaradásából adódó hátrányok:

Nem tisztázódik a folyamat, és ha daganatos elváltozás vagy akut, életveszélyt is jelenthető folyamat fennáll, akkor súlyosbodó vagy gyógyíthatatlan állapot alakulhat ki.