



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Bényi Béla főorvos

BETEGTÁJÉKOZTÓ

A marsupialisatio

(A Bartholin mirigy tályogjának műtete)

A beavatkozás célja

A beavatkozás célja a hüvelybemenetnél, a nagyajkak alsó harmadában elhelyezkedő Bartholin – mirigy megnyitása, gyulladt, gennyes bennékének kiürítése.

Az eljárás kapcsán - szükség esetén - egyedi megítélés alapján lehetőség van szövettani vizsgálat kérésére is az eltávolított anyagból.

A beavatkozás menete

A beavatkozás rövid vénás altatásban történik, a műtét során nem fog érezni semmit. A szeméremtest fertőtlenítését követően bemetszés történik az érintett oldali nagyajak belső oldalánál, így a mirigy bennéke kiürül. Ezután a tályog üregét fertőtlenítőszerrel átöblítjük. A sebszélek összetapadásának megelőzése érdekében – hogy csökkentsük az esetleges kiújulás lehetőségét – a sebszéleket kiöltjük, esetenként a tályogüregben draint vagy gézcsíkot hagyunk másnapig,

A beavatkozás előnye, hátrányai. A beavatkozás elmaradásának esetleges következményei.

A beavatkozás előnye az elváltozás hatékony kezelése, a fájdalom jelentős csillapítása mellett. A műtétet követően egynapos kórházi tartózkodás indokolt, a műtét utáni napon a behelyezett drain vagy gézcsík eltávolítása után történik a hazabocsátás. A behelyezett varratok felszívódóak, eltávolításuk nem szükséges.

A beavatkozás esetlegesen antibiotikus kezeléssel elkerülhető, ám a teljes gyógyulás esélye rendkívül csekély és elhúzódó lehet. Beavatkozás nélkül a gennyes folyamat tovább terjedhet a szeméremtestre és a hüvely mentén más szervekre is, súlyos panaszokat okozva.

A beavatkozás lehetséges szövődményei

Mint minden műtéti beavatkozásnak, a marsupialisationak is lehetnek általános, az altatásból eredő és a műtétre jellemző szövődményei. Fertőzések, vérzés, újabb tályog kialakulása, vérrögképződés ezen beavatkozás után is felléphetnek. A szövődmények gyakorisága azonban az elvégzett műtétek számához viszonyítva csekély.